

O GÊNERO *Eugenia* L. (MYRTACEAE) NA RESTINGA DA MARAMBAIA – RJ.

SOUZA, Marcelo da Costa¹ & MORIM, Marli Pires². 1 Mestrando da Escola Nacional de Botânica Tropical – JBRJ;
2 Pesquisadora do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. (msouza@jbrj.gov.br)

A Restinga da Marambaia situa-se nos municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí e Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro (43°32' e 44°01'W, 23°01' e 23°06'S). Apresenta uma diversidade de ambientes, que proporciona fisionomias vegetais variadas, como as que recobrem os cordões arenosos, os brejos permanentes ou temporários, a praia e as dunas. Myrtaceae é uma das famílias mais diversas na Restinga da Marambaia, contando com 31 espécies das 3 subtribos: Eugeniinae (17), Myrciinae (9) e Myrtinae (5). *Eugenia* (subtribo Eugeniinae) é um dos maiores gêneros da família, representado por mais de 500 espécies nas Américas e cerca de 350 espécies para o Brasil. Este trabalho teve por objetivo realizar o levantamento das espécies de *Eugenia* ocorrentes na Restinga da Marambaia. Os estudos foram baseados em coleções dos herbários GUA, R, RB e RBR e em expedições periódicas nas diferentes formações vegetais nos anos de 2002 e 2003 com coletas depositadas nos herbários RB e RBR. É apresentada uma chave de identificação, descrições e ilustrações dos táxons, além de dados relativos à fenologia e distribuição geográfica dos táxons. *Eugenia* está representado por 13 espécies, sendo o gênero com o maior número de espécies para a região, são elas: *Eugenia brasiliensis* Lam., *E. copacabensis* Kiersk., *E. excelsa* O.Berg, *E. neonitida* Sobral, *E. neosilvestris* Sobral, *E. ovalifolia* Cambess., *E. oxyenthophylla* Kiersk., *E. rostrata* O.Berg, *E. rotundifolia* Casar., *E. sulcata* Spring ex Mart., *E. uniflora* L., *E. velutiflora* Kiersk. e *Eugenia* sp.. (FAPERJ)