

O GÊNERO *Stylosanthes* Sw. (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) NA SERRA DO UMBUZEIRO, PAULO AFONSO, BAHIA, BRASIL.

TEIXEIRA, Alessandra Gomes^{1,3}; **CONCEIÇÃO, Adilva de Souza**^{2,3}; 1 Graduanda; 2 Docente; 3 Departamento de Educação e Ciências, Universidade do Estado da Bahia, BA. (elvany@bol.com.br)

A família Leguminosae inclui 630 gêneros e 18.000 espécies com distribuição tropical e temperada. O gênero *Stylosanthes* Sw. possui cerca de 50 espécies, distribuídas nos trópicos e subtrópicos. No Brasil o gênero está representado por 25 espécies, das quais 11 são referidas para Bahia; é um gênero de grande importância econômica, devido ao seu grande potencial forrageiro. O gênero em questão está constituído por arbustos e subarbustos eretos, semi-eretos ou prostrados, perenes e anuais. O trabalho tem como objetivo realizar o levantamento das espécies do gênero *Stylosanthes* que ocorre na Serra do Umbuzeiro. Foram realizadas coletas quinzenais, no período de abril/2003 a abril/2004. A descrição e identificação foram realizadas com base em coletas, bibliografias especializadas, levantamento nos principais herbários da Bahia: ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS e exame das amostras em estereomicroscópio, seguida de confecção de prancha e descrição da espécie. A Serra do Umbuzeiro está localizada no município de Paulo Afonso, Bahia, delimitada pelas coordenadas 09° 35' 15,7" a 38°12'37,3" de latitude Sul e, 09° 34' 47,6" a 38°12'17,0" de longitude WGr e, dista 21km da cidade de Paulo Afonso. A vegetação típica da região é a caatinga arbustiva. A Serra é bastante utilizada na região como área de lazer, onde se pratica principalmente esportes radicais e romarias. O gênero *Stylosanthes* Sw. apresenta um marcado polimorfismo, principalmente nos órgãos vegetativos; na área de estudo foi registrada até o momento a ocorrência de *Stylosanthes viscosa* Sw. Na serra a espécie ocorre ao longo da trilha, geralmente em áreas degradadas, em barrancos e algumas áreas abertas. (FAPESB)