

Seção: Etnobotânica

PALMEIRAS ANDINAS E CAMPONESES NA FLORESTA DE NUVENS DO MUNICÍPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ, COLÔMBIA.

Oscar Adolfo Perdomo BÁEZ (1)

André R. Terra NASCIMENTO (1)

Edwin Trujillo TRUJILLO (2)

Bruno Guimarães UBIALI (3)

A Floresta Tropical Montana Nublada (FTMN) ocorre geralmente em elevações superiores a 1000 metros, sendo um tipo de ecossistema de alta biodiversidade ainda pouco conhecida. Ocupa uma área total inferior a 0,5% da superfície terrestre. A presença frequente de nuvens ao nível da vegetação é característica notória deste tipo de ecossistema. Dos países com maior diversidade de palmeiras (Arecaceae), a Colômbia destaca-se com mais de 200 espécies, 20 delas endêmicas dos Andes. Os objetivos deste trabalho foram i) identificar o potencial de uso das espécies de palmeiras andinas pela comunidade camponesa El Caraño, Município de Florência, Caquetá, Colômbia e ii) comparar estes dados com artigos recentes envolvendo os usos reportados para estas espécies de palmeiras na região. Para esta finalidade foram levantadas as espécies nativas de palmeiras andinas no entorno da comunidade camponesa, e aplicadas 27 entrevistas etnobotânicas abertas, procurando informações referentes à distribuição das espécies de palmeiras e seus usos. A comparação foi feita usando como base sete artigos publicados nos últimos cinco anos. Foram identificadas 13 categorias de uso, procurando respeitar as empregadas pelos diferentes autores. Para as 20 espécies da família Arecaceae encontradas no levantamento, foram reportados pelos camponeses usos para 8 (40%) e na revisão de literatura para um total de 16 espécies (80%). O presente estudo indicou que 60% das espécies presentes na área não são utilizadas. A comunidade camponesa de El Caraño está claramente subutilizando os recursos oferecidos pelas palmeiras nesta região. Isto representa uma perda do conhecimento sobre estas espécies e seus potenciais usos. Por outro lado, este cenário apresenta uma grande oportunidade para desenvolver programas de conservação da Floresta Tropical Montana Nublada baseados no aproveitamento sustentável dos recursos oferecidos pelas diferentes espécies de palmeiras, que hoje são pouco aproveitados.

Palavras-chave: Etnobotânica, Arecaceae, Conservação

Créditos de Financiamento: CNPq e Fapemig

1. Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Biologia, Laboratório de Ecologia, Uberlândia, Minas Gerais. E-mail: oscarperdomo79@hotmail.com
2. Programa de Ingenieria Agroecológica, Herbario HUAZ, Universidad de La Amazonia, Florencia, Caquetá, Colômbia
3. Departamento de Recursos Naturais/Ciências Florestais - Faculdade de Ciências Agrônômicas - Unesp/Botucatu, Botucatu, São Paulo.