Seção: Ecologia Vegetal

FATORES DETERMINANTES NA PREDACÃO DE SEMENTES PRÉ-DISPERSÃO EM *Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger (Fabaceae- Mimosoidae) EM UMA ÁREA CAMPESTRE DO RS

Marcela Saldanha PIRES (1)
Rubem Samuel de AVILA JR (2)

A dinâmica de populações vegetais está relacionada à produção e disponibilidade de sementes e, nesse sentido, a ação de predadores das mesmas influenciaria nessa dinâmica. Alguns fatores tem sido associados à incidência desta interação e este trabalho teve como objetivo avaliar a ação de dois fatores ecológicos na taxa de predação de sementes pré-dispersão de *V. caven*: a estrutura espacial da população e as distintas estruturas de trofobiose observadas. Entende-se por estrutura de trofobiose a conformação do conjunto de interações estabelecidas por *V. caven*, insetos sugadores e formigas. Cinquenta indivíduos foram amostrados para estimar a taxa de predação de frutos na população estudada. Para avaliar a ação do primeiro fator foram escolhidas 50 plantas e obtido o índice de agrupamento e cada indivíduo foi avaliado quanto à proporção de frutos predados. Outros 25 indivíduos foram amostrados para coleta de frutos e contagem de sementes predadas. Seis tipos de estruturas de trofobiose foram observadas. Cada uma foi avaliada quanto à predação de sementes. Na população estudada a proporção média de frutos predados por indivíduo ($6 \pm 2,85$) foi significativamente mais alta ($W=1783,5$, $p=0,0007$), porém, o número médio de sementes viáveis ainda é significativamente maior por fruto ($x=10,17 \pm 4,25$, $W=194$, $p=0,022$). A estrutura espacial não explicou as distintas taxas de predação na população, pois não existe relação entre o grau de agrupamento das plantas e a taxa de predação ($R^2=0,0018$, $p=0,7697$). Quanto às estruturas de trofobiose, houve variação significativa nas taxas de predação de sementes entre os seis tipos observados ($H=12,0846$, $g.l=5$, $p=0,03$). Os menores valores de sementes predadas foram encontrados na interação com *Coccideos* e *Camponotus* ($x=7,09 \pm 6,83$). Assim, é possível afirmar que a espacialidade não atue na intensidade de predação de sementes e que as distintas interações estabelecidas pela espécie atuem diferencialmente na proteção das sementes em *V. caven*.

Palavras-chave: frutos, trofobiose, estrutura espacial

Créditos de Financiamento:

(1)Universidade Federal do Pampa
Rua Rolino Leonardo Vieira, 1370, Bairro Vargas, CEP 97300-000, São Gabriel-RS, Brasil
marcelasbio@gmail.com
(2)Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel-RS