Seção: Morfologia/Anatomia**DISSOCIAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE COMPONENTES CELULARES DO TEGUMENTO DE SEMENTES COM DORMÊNCIA FÍSICA DE ARBÓREAS DA MATA ATLÂNTICA**

Graziela Elisabeth GEISLER
Tassiane Terezinha PINTO
Hilaire Moura RODRIGUES
Maria Terezinha Silveira PAULILO
Marisa SANTOS

Sementes com dormência física apresentam características especiais nos tegumentos, tornando-as impermeáveis à água, desta forma, o conhecimento destas características é fundamental para o entendimento da quebra da dormência e fisiologia da germinação destas sementes. A dissociação dos componentes dos tegumentos possibilita melhor análise das estruturas celulares. O trabalho visou analisar a estrutura celular dos tegumentos das sementes de Fabaceae (*Peltophorum dubium*, *Senna multijuga* e *Mimosa bimucronata*) e Rhamnaceae (*Colubrina glandulosa*), espécies arbóreas da Mata Atlântica com dormência física. Para a dissociação, foram usadas sementes inteiras, devido ao reduzido tamanho. As sementes foram imersas em H₂O₂ e ácido acético glacial (1:1), em frascos vedados, e mantidas em estufa a 60°C, por 48 h. Após a solução foi pipetada, substituída por água destilada e centrifugada. A seguir, o material sedimentado, natural ou com reagentes histoquímicos, foi analisado em microscopia óptica. Espécies de Fabaceae apresentaram macroesclereídes (constituintes da camada paliçada), estreitas e alongadas, medindo cerca de 45 µm de comprimento, com linha lúcida medianamente. Estas, em *C. glandulosa*, são bem mais alongadas que nas espécies de Fabaceae, cerca de 300 µm de comprimento. Também foram encontradas, nas Fabaceae, osteoesclereídes ou *hourglass*, células com paredes espessadas e de extremidades distais dilatadas, que constituem um estrato celular sob a paliçada. Em *C. glandulosa*, foram identificadas esclereídes, com formato retangular, com paredes bem espessadas, células que formam o tecido abaixo da camada paliçada. O uso de reagentes específicos para identificação de lignina, suberina e calose ainda possibilitou melhor compreender os aspectos celulares envolvidos na impermeabilização dos tegumentos e consequente entendimento dos processos relacionados com quebra de dormência.

Palavras-chave: macroesclereide, osteoesclereide, tegumento

Créditos de Financiamento: Capes

Programa de Pós-graduação em Biologia Vegetal -Universidade Federal de Santa Catarina. Caixa Postal 476, Campus Universitário Trindade, CEP 88040-900, Florianópolis – SC.