

Seção: Sistemática/Taxonomia

TRÊS NOVAS ESPÉCIES E UMA NOVA VARIEDADE DE *Meliosma* Blume

Eliana RAMOS (1)
Xavier CORNEJO (2)

Meliosma Blume (Sabiaceae) ocorre em áreas tropicais e subtropicais da Ásia e Américas. Em análise de material de herbário para revisão taxonômica de Sabiaceae neotropicais, três espécies e uma variedade não descritas de *Meliosma*, ocorrentes no Ecuador, México e Perú, apresentaram material suficiente para publicação. A espécie ecuatoriana difere de *M. bogotana* Steyerl. e *M. boliviensis* Cuatrec. nos frutos menores, quilhados, inflorescência menor, menos ramificada; de *M. arenosa* Cuatrec. & Idrobo no indumento das folhas, inflorescência mais robusta, flores e infrutescência maiores, e frutos menos quilhados. A espécie mexicana difere de *M. dentata* Urb. no tamanho dos pecíolos, ápice das folhas, inflorescência e pétala interna ciliada por toda a margem; lembra *M. mexicana* Steinm., mas difere na inflorescência, domácias nas axilas da nervura principal com as secundárias, pecíolos, pedicelos e pétalas externas maiores, pétalas internas fortemente bífidas e ciliadas por toda a margem. A espécie peruana lembra *M. allenii* Standl. & L.O. Williams, *M. vasquezii* A.H. Gentry, e *M. wurdackii* Cuatrec., mas difere na inflorescência, infrutescência e frutos mais robustos; de *M. novogranatensis* Cuatrec. & Idrobo, difere na inflorescência mais ramificada e congesta, pétalas internas e frutos; de *M. palaciosii* A.H. Gentry ex Cornejo, difere na inflorescência e infrutescência mais congestas e frutos maiores; de *M. youngii* A.H. Gentry, no hábito, infrutescência mais robusta, estreita, e frutos maiores. A nova variedade ecuatoriana lembra *M. boliviensis* Cuatrec., mas apresenta pecíolos mais curtos, lâmina foliar laxamente estrigulosa, e tendência a ter inflorescência menor; de *M. gracilis* X. Cornejo & Bonifaz, difere na inflorescência menor, mais congesta, e flores sésseis a subsésseis. No geral, os caracteres mais importantes na separação das espécies são a nervação das folhas, paralela ou ascendente; e a inflorescência, paniculada em 2, 3 ou 4 ordens, corimbiforme ou racemiforme.

Palavras-chave: Sabiaceae, Taxonomia de fanerógamas, espécies neotropicais

Créditos de Financiamento: Agradecimentos: CNPq (CNPq 141601/2008-6), IAC e Missouri Botanical Garden (Shirley A. Graham).

(1) UNESP – Universidade Estadual Paulista, Depto. de Botânica, Instituto de Biociências, Av. 24-A 1515, 13506-900, Rio Claro, SP, Brasil. elianaramos.bio@gmail.com

(2) Herbarium GUAY, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil. P.O. Box 09-01-10634, Guayaquil, Ecuador.