

Seção: Sistemática/Taxonomia***Hysterionica matzenbacherii* A.A.Schneid., UMA NOVA ESPÉCIE DE ASTERACEAE-
ASTEREAE DO SUL DO BRASIL**

Angelo Alberto SCHNEIDER(1)

Ilsi Iob BOLDRINI(2)

O gênero *Hysterionica* (Asteraceae) pertence à tribo Astereae, subtribo Conyzinae e é estreitamente relacionado ao gênero *Neja*. *Hysterionica* contém aproximadamente dez espécies que ocorrem no sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Durante o estudo taxonômico do gênero para o Brasil, foi reconhecida uma nova espécie, *H. matzenbacherii*, encontrada até o momento apenas na Serra do Rio do Rastro no município de Lauro Müller em Santa Catarina. A espécie foi descrita, ilustrada e comparada com espécies similares. *Hysterionica matzenbacherii* possui hábito herbáceo e é caracterizada pelas folhas de margem incisa a partida, da porção mediana ao ápice do limbo. A nova espécie é morfológicamente similar às espécies brasileiras *H. pinnatiloba* e *H. pinnatisecta* pelo hábito, capítulos e flores, mas difere pelas características das folhas. Esta espécie ocorre em paredões de basalto da Serra do Rio do Rastro (28°23'45.15" S, 49°32'37.14" O) na parte leste da formação Serra Geral, entre 900-1.400 m de altitude. De acordo com as categorias de ameaça da IUCN, *H. matzenbacheri* é considerada em perigo (EN). O epíteto específico foi referido em homenagem ao professor Nelson Ivo Matzenbacher, coletor do espécime *typus* e que tem contribuído enormemente ao estudo das Asteraceae do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Palavras-chave: Compositae, taxonomia,**Créditos de Financiamento:** CNPq (Edital MCT/CNPq/MEC/CAPES/PROTAX nº 52/2010)

(1) Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, Rua Gonçalves Dias, 570, Bairro Menino Deus, Porto Alegre. (angeloschneider@yahoo.com.br)

(2) Departamento de Botânica, Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.