Seção: Sistemática/Taxonomia**FUNGOS ISOLADOS DE SOLO CONTAMINADO COM PESTICIDA ORGANOFOSFORADO CLORPIRIFÓS EM ÁREAS DE CULTIVO DE HORTALIÇAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO**

Sérgio Murilo Sousa RAMOS (1)
Renan do Nascimento BARBOSA (1)
Diogo Xavier LIMA (1)
Cristina Maria Souza-MOTTA (1)
Neiva Tinti OLIVEIRA (1)

O uso indiscriminado de pesticidas no campo representa um risco para a saúde das pessoas, sejam as que lidam diretamente com estes produtos tóxicos ou a população em geral que consome os alimentos previamente pulverizados com agrotóxicos. Os resíduos no solo destes insumos comprometem a biodiversidade e a capacidade produtiva edáfica. Por outro lado, alguns grupos de fungos mostram-se tolerantes à presença desses compostos químicos e, em certos casos, os metabolizam através de atividades biorremediadoras que beneficiam a microbiota no ambiente agrícola. Dentre os pesticidas mais utilizados no cultivo de hortaliças está o organofosforado clorpirifós, altamente tóxico para os humanos. Com o intuito de isolar e identificar fungos tolerantes a este pesticida em áreas destinadas ao cultivo de hortaliças no município de Caruaru no Estado de Pernambuco, realizou-se a coleta de 15 amostras compostas de solo em três canteiros previamente tratados com o organofosforado. Em cada canteiro foram retiradas cinco amostras compostas, sendo cada uma resultante da coleta de três subamostras. De cada amostra, extraiu-se uma porção de 25g que foi suspensa em 225mL de água destilada esterilizada (diluição 1:10), desta diluição 10mL foram adicionados a 990mL de água destilada esterilizada (Diluição 1:1000). Suspensões de 1mL do solo na concentração de $10^{-3}g.L^{-1}$ foram adicionadas a placas de Petri que continham Meio Mínimo associado ao antibiótico cloranfenicol ($0,025g.L^{-1}$) e ao agrotóxico clorpirifós ($1,5mL.L^{-1}$). O experimento foi realizado em quadruplicata e o controle desprovido da suspensão do solo. Obtiveram-se 60 isolados, distribuídos entre os gêneros: *Trichoderma* (2%), *Fusarium* (6%), *Aspergillus* (24%) e *Penicillium* (68%). O controle permaneceu sem crescimento fúngico durante todo o ensaio. A predominância do gênero *Penicillium* demonstra a sua elevada tolerância aos resíduos do agrotóxico clorpirifós no solo. Apesar de um número pouco expressivo dos gêneros *Trichoderma*, *Fusarium* e *Aspergillus*, estes são igualmente tolerantes. Portanto, os gêneros de fungos isolados na presença do pesticida em questão revelam o potencial de tolerância dos mesmos na microbiota edáfica e sinaliza atividades de biorremediação desses organismos que podem ser investigadas em estudos posteriores.

Palavras-chave: biorremediação, agrotóxicos, microbiota

Créditos de Financiamento: FACEPE

(1)Departamento de Micologia
Universidade Federal de Pernambuco, Rua Prof. Nelson Chaves, s?n.
Cidade Universitária, Recife-PE, Brasil.
e-mail: biof.sergio22@gmail.com