

O GÊNERO *Buddleja* L. (SCROPHULARIACEAE) NO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL

Laura Calderan de Lannoy, |Lucas Katsumi Rocha Hinoshita & Renato Goldenberg

Departamento de Botânica, Setor de Ciências Biológicas – UFPR, Curitiba, PR,
Brasil. lauradelannoy@gmail.com

O gênero *Buddleja* L. é composto por arbustos de folhas opostas, com tirso terminais, flores actinomorfas e corola gamopétala. Contando com cerca de 100 espécies, o gênero exibe distribuição predominantemente neotropical e, no Brasil, é representado por 14 espécies. Originalmente descrito na família Scrophulariaceae, passou por muitas mudanças, sendo tratado em Loganiaceae, depois Buddlejaceae para, no início dos anos 2000, ser novamente tratado em Scrophulariaceae, onde permanece até hoje. Para este estudo, foram analisados materiais de *Buddleja* coletados no Paraná, depositados nos herbários MBM e UPCB, bem como informações e imagens disponibilizadas em herbários virtuais. No Paraná ocorrem dez espécies: *Buddleja brachiata* Cham. & Schldl., *Buddleja cuneata* Cham., *Buddleja davidii* Franch., *Buddleja elegans* Cham. & Schldl., *Buddleja grandiflora* Cham. & Schldl., *Buddleja hatschbachii* E.M.Norman & L.B.Sm., *Buddleja oblonga* Benth., *Buddleja ramboi* L.B.Sm., *Buddleja stachyoides* Cham. & Schldl., e *Buddleja thyrsoides* Lam., sendo uma delas exótica (*B. davidii*) e uma nova ocorrência (*B. ramboi*). O trabalho conta com chave de identificação, ilustrações, mapas de distribuição e descrições para as espécies ocorrentes no Paraná.

Palavras-chave: Buddlejaceae, Flora, Loganiaceae, Sistemática, Taxonomia